

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Baş ve Boyun Patolojisi

EPS020(762)

Kulak heliksinde elastotik nodül olgusu

Fatih Mert Doğukan¹, Rabia Doğukan¹, Gül Emek Yüksek¹

¹ Mardin Devlet Hastanesi

Giriş

Kulağın elastotik nodülleri ilk olarak antihelikste, daha sonra helikste de tanımlanmış açık gri-beyaz renkli, küçük papüler lezyonlardır. Patogenezinde ultraviyole ışınlarına bağlı ciltteki ekstrasik yaşlanma suçlanmakta olup sıklıkla güneş ışını maruziyeti bulunan erişkin yaş grubu erkek hastalarda görülmektedir. Ayırıcı tanıda aktinik granülom, kondrodermatitis nodularis helisis, weathering nodül gibi cildin elastik komponentini tutan diğer hastalıklar yer almaktadır.

Olgu

60 yaşında erkek hasta sol kulak heliksinde 0,5 cm çapında gri-krem renkli ağrısız tek papüler lezyon ile başvurdu. Bazal hücreli karsinom ön tanısı ile eksize edilen lezyonun histopatolojik incelemesinde, hafif ortokeratotik epidermis altında, yüzeysel dermiste küçük çaplı telenjektatik damar yapıları görüldü. Retiküler dermiste belirgin solar elastoz ve kıvrımlı elastik lifler, lezyonun merkezinde ise düzensiz kabalaşmış elastotik lif yapıları mevcuttu.

Sonuç

Elastotik nodüller nadir görülen lezyonlar olup patogenezinde güneş ışını maruziyetine bağlı olarak elastik liflerde oluşan aktinik dejenerasyon suçlanmaktadır. İlk olarak antihelikste, multipl ve genellikle bilateral lezyonlar olarak tanımlanmışken daha sonra helikste ve tek olarak da görülebildiği bildirilmiştir. Uzun süre önce tanımlanmış olmakla birlikte bildirilen olgu sayısı oldukça düşüktür. Bu açıdan kulakta görülen ve sıklıkla elastotik nodüller ile karışan kondrodermatitis nodularis helisis veya weathering nodül gibi diğer antitelerden ayırımını yapabilmek önemlidir.

Anahtar Kelimeler :Elastotik nodül, Solar elastoz, Kondrodermatitis nodularis helisis