

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



PB Sözel Sunum

Hepatobilier ve Pankreas Patoloji

PB008(934)

Karaciğer iğne biyopsilerinde bir yıllık deneyimimiz

İlknur Küçükosmanoğlu¹, Bekir Turgut²

¹ Sbü.konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü

² Sbü.konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü

AMAÇ:Karaciğerin en sık tümörleri metastatik tümörlerdir. Karaciğer tümörlerine, genellikle, kaynağını belirlemek için biyopsi yapılır. En sık kaynak, kolon, üst gastrointestinal sistem, pankreas ve meme olarak gösterilmiştir. Seyrek oranda lenfoma, sarkom yayılımı gözlenmiştir.Bu çalışmada amaç laboratuvarımızda incelenen karaciğer iğne biyopsilerinin sonuçlarını değerlendirilerek, literatür ile karşılaştırmak ve kendi bölgesel verilerimizi oluşturmaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmaya 2017-Temmuz/2018-Temmuz döneminde, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, karaciğerde kitle nedeniyle yapılmış, 41 adet iğne biyopsi örneği dahil edilmiştir. Tümörün histopatolojik özellikleri, immünohistokimyasal boyalar ve radyolojik bulgularla birlikte değerlendirilmiştir.

BULGULAR: 41 hastanın 2' si (%4,9) hepatosellüler karsinom, 1'i(%2,4) lenfoma, 1' i (%2,4) hemanjiom, 1' i (%2,4), mezenkimal hamartom, 1' i (%2,4) gastrointestinal stromal tümör, 5' i (%12,2) nöroendokrin karsinom metastazı, 30' u (%73,2) adenokarsinom olarak raporlanmıştır. Olguların 16' sı (%39) kadın, 25' i (%61) erkektir. Ortalama yaş $64,37 \pm 10,5$ (35-85)'dir. Tümör çapı ortalaması $5,26 \pm 3,41$ (1-15)cm' dir. Tümörlerin 22' si (%53,71) sağ lobda, 19' u (%46,3) sol lobda lokalizedir.Ayırıcı tanı için uygulanan immünohistokimyasal boyaların ortalama sayısı $7,20 \pm 2,8$ (0-14) adettir. Biyopsi materyalinin uzunluğu ortalama $1,4 \pm 0,54$ (0,5-3) cm' dir.Olguların 7' si (%17) akciğer, 2' si (%4,9) karaciğer, 6' sı intrahepatik safra yolları (%14,6), 6'sı(%14,6) kolon, 3' ü (%7,3) meme, 2' si (%4,9) mide, 8' i (%19,5) pankreas, 2' si (%4,9) prostat, 2' si (%4,9) safra kesesi kaynaklıdır. 3 olguda (%7,3) primer odak saptanamamıştır.

SONUÇ:Karaciğer kitlelerinin büyük çoğunluğunu malign tümörler oluşturmaktadır. Bu tümörlerin çoğu metastatiktir. Bizim serimizin değerlendirme sonuçları, literatür ile uyumludur. En sık pankreas adenokarsinomu metastazı izlenmiştir. Karaciğer kitlelerine uygulanan iğne biyopsisi yöntemi hem kolay uygulanabilirliği hem de tanısal olması nedeniyle kullanışlı bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler :karaciğer,kitle, iğne biyopsi