

Poster Sunum

Dermatopatoloji

PS640

BURUN YERLEŞİMLİ NADİR DERİ EKİ TÜMÖRÜ; KONDROID SİRİNGOMA

Hasan Dindar¹, Meltem Öznur², Ayşegül İsal Arslan²

¹Tekirdağ Devlet Hastanesi

²Namık Kemal Üniversitesi

Giriş

57 yaşında erkek hasta kliniğe burun cildinde dorsum yerleşimli kitle sebebiyle başvuruyor. Kitle bazal hücreli karsinom, skuamoz hücreli karsinom ön tanıları ile eksize ediliyor. Histopatolojik değerlendirme sonrasında olgu kondroid siringoma olarak rapor ediliyor. Kondroid siringoma cildin %0,1 oranında görülen primer deri eki tümörüdür.

Olgu

Olgumuzda burun dorsum yerleşimli cilt üzerinde bulunan lezyon, eksize edilerek laboratuvarımıza gönderiliyor. Makroskopik değerlendirmede 1,7x1,6 cm cilt dokusu üzerinde ciltten kabarık 0,7 cm çaplı bej renkli alan görüldü. Mikroskopik inceleme sonrasında, dermis yerleşimli düzgün sınırlanan miksoid stroma içinde duktal yapılanan kuboidal epitelle döşeli epitelyal alanlar dikkati çekmiştir. İmmunhistokimyasal olarak yapılan çalışmalarda Pansitokeratin epitelyal alanda, SMA antikoruna ile değişken oranda stromada pozitiflik görüldü. Kondroid siringoma orta yaş erkeklerde kadınlara göre daha sık, en sık burun lokalizasyonlu baş, boyun yerleşimli cildin deri eki kaynaklı primer nadir benign tümörüdür.

Sonuç

Kondroid siringomanın dermoskopik inceleme ile spesifik bulguları bulunmamaktadır. Klinikte bazal hücreli karsinom ve skuamoz hücreli karsinom ile karışabilen neoplazm oldukça nadir görülmesi sebebiyle paylaşılmaya değer görülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Kondroid, siringoma