

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Meme Patolojisi

EPS448(586)

Memenin düşük dereceli adenoskuamöz karsinomunu: nadir bir olgu

Betül Demirciler Yavaş¹, Mehmet Özer², Çiğdem Tokyol¹, Çiğdem Özdemir¹, Murat Akıcı³, Hasan İlyas Özardal¹

¹ Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ad

² Bayburt Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarı

³ Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

GİRİŞ

Düşük dereceli adenoskuamöz karsinom, memenin benign ve malign lezyonları ile karışabilen metaplastik meme karsinomlarının farklı klinikopatolojik özellik taşıyan bir alt tipidir. Özellikle sitolojik örneklerde, kor biyopsilerde, intraoperatif kesitlerde tanı zorluğu yaşanabilir.

OLGU

Sol memede, 2 ay öncesinde benign tanı alan, kitle eksizyonu öyküsü olan, 62 yaşında kadın hastanın, eksizyon alanında ele gelen kitle şikayetiyle başvurusuyla, hastaya reeksizyon yapıldı. Intraoperatif incelemesinde; yoğun inflamatuvar hücre infiltrasyonu, yağ nekrozu içerisinde, sklerotik alanların bulunduğu ve bu bölgelerde yer yer hafif atipi içeren tübül yapılarının olduğu dikkati çekti, tanı parafin takibine bırakıldı, eksizyon sınırlarında lezyon izlenmediği bildirildi. Rutin takip işlemleri sonrası elde edilen kesitlerde, fokal alanlarda yoğun sklerotik stroma içerisinde, mitotik figürleri de bulunan, eozinofilik sitoplazmalı, hafif atipik nükleuslu, epitelyal hücreler-hücre grupları izlendi. Duktus yapılarının büyük kısmında SMA, kalponin, CK5/6, HMW Keratin ile myoepitelyal hücreler pozitif boyandı, bazılarında myoepitelyal hücreler seçilemedi. Sklerotik alanlarda, infiltratif giden hücrelerde P63 pozitif boyandı. Tümör alanları ER, PR, cerbB2 ile negatifti. Olgu bu bulgularla Düşük dereceli adenoskuamöz karsinom olarak yorumlandı. Tümör çevresinde sklerozan adenozis, duktal epitelyal hiperplazi, intraduktal papillom alanları da mevcuttu.

SONUÇ

Düşük dereceli adenoskuamöz karsinom, radial skar/kompleks sklerotik lezyonlar başta olmak üzere infiltratif siringomatöz adenom, adenomyoepitelyom, tübüler karsinom gibi benign veya düşük dereceli malign lezyonlarla karışabilen, tanı koymada ciddi zorluklar yaşanan bir lezyondur. Myoepitelyal hücreler düşük dereceli adenoskuamöz karsinomlarda kesintili boyanır. Tümör alanlarında ER, PR, cerbB2 negatiftir. Özellikle intraoperatif tanı koymak oldukça zordur ve yağ nekrozu, inflamasyon gibi sebeplerle bazen daha da zor hale gelebilmektedir. Tedavisinde geniş eksizyonun yeterli olduğu, aksiller lenf nodu metastazının ise çok nadir olduğu bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler : Düşük dereceli adenoskuamöz karsinom, meme, immunohistokimya