

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Dermatopatoloji

EPS091(848)

Nevoid melanoma: olgu sunumu

Nermin Karahan¹, İbrahim Metin Çiriş¹, Birgül Aydoğan², Gamze Erkılınç¹, Özlem Durak¹

¹ Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Isparta

² Isparta Şehir Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Nevoid Melanoma benign melanositik lezyonlarla karışabilen nadir bir melanoma subtipidir. 1980’de Levene nevoid melanomayı psödonevoid ve verrüköz melanoma olarak tariflemiştir. Nevoid Melanoma histomorfolojik olarak intradermal nevüs ve diğer içsi, epiteloid hücreli nevüsleri anımsatabilir. Literatürde benign melanositik lezyon tanısı alma oranı % 20-30 olarak bildirilmiştir. Bu makalede nadir ve melanositik lezyonlara bakarken akılda tutulması gereken bir melanoma subtipi olan nevoid melanoma sunulmuştur.

Olgu: 30 yaşında erkek hasta çocukluğundan beri kulak kepçesinde var olan lezyonun son 1-2 ay içerisinde büyümesi ve yüzeyinde kanama olması nedeni ile Isparta Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümünde lezyonun eksizyonu yapılmıştır. Makroskopik incelemede 0,8x0,9x0,4 cm ölçülerinde deri derialtı dokusu yüzeyinde en yakın cerrahi sınırdaki devam eden 1,2x1x0,5 cm ölçülerinde siyah renkli lezyon izlenmiş olup mikroskopisinde yüzeyi ülser görünümünde polipoid lezyonda yüzeyden derine doğru matürasyonda kaybın dikkati çektiği, fokal alanlarda olağan görünümde yuvalar yapan belirgin bir atipinin izlenmediği, çoğu alanda yuvalar şeklinde nükleer irileşme gösteren, eozinofilik nükleollu yer yer kahverenkli pigment içeren hücrelerden oluşan arada tipik ve atipik mitozların dikkati çektiği lezyon izlendi. Olgu Malign Melanoma şüphesi ile Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalına konsülte edildi. Kliniğimizde yapılan immünohistokimyasal çalışmada tarifiyen hücrelerde HMB45, MelanA, S100 ile yaygın ekspresyon izlenmiş olup Ki67 ile proliferasyon indeksi % 30 olarak değerlendirildi. SiklinD1 ile lezyonda yaygın ekspresyon gözlemlendi. Histomorfolojik ve immünohistokimyasal bulgular eşliğinde olguya nevoid melanoma tanısı konuldu.

Tartışma: Nevoid melanomayı benign melanositik nevüslerden ayıran en önemli özellik lezyonun tabanına doğru çok sayıda mitozun gözlenmesidir. Belirgin arkitektürel kayıp mevcut değildir. Nevoid melanomada matürasyonda kayıp olduğu için HMB45 ile lezyonun tabanına doğru dağınık halde yaygın boyanma izlenirken banal nevüslerde lezyonun yüzeyinde boyanma vardır. Melanositik lezyonları değerlendirirken lezyonun derinliklerinde mitoz görülmesi çok beklenen bir durum değildir. Matürasyonun azaldığını düşündüğümüz vakalarda mitoz açısından dikkatli değerlendirme yapılması gerekmektedir. Nevoid melanoma akla gelmediğinde günlük pratikte kolaylıkla atlanabilecek bir malign melanoma subtipidir.

Anahtar Kelimeler : Melanoma, nevoid, mitoz, matürasyon, nevüs