

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Jinekopatoloji

EPS331(915)

Osteoid metaplazi gösteren endometrioid adenokarsinom zemininde gelişen uterin karsinosarkom

Elif Turan¹, Gökhan Erdil², Mustafa Emre Ercin¹, İsmail Saygın¹, Kübra Öztürk Türker¹

¹ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

² Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Giriş:

Endometriyal stromal metaplazi nadir rastlanılan bir durum olup stromal pluripotent kök hücre kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. Tek başına karşılaşılabileceği gibi endometriyal sarkom veya karsinosarkom komponenti olarak da rastlanılabilmektedir.

Olgu:

37 yaşında kadın hasta anormal uterin kanama nedeniyle tetkik edilirken ultrasonografik olarak 17 mm ölçülen endometriyal kalınlaşma saptanıp endometriyal küretaj yapılmıştır. Materyalin histopatolojik incelemesinde endometriyal polip içerisinde osteoid metaplazi gösteren grade 1 endometrioid adenokarsinom görülmüştür. Klinik takiplerinde progrese olan hastaya 6 ay sonra histerektomi operasyonu uygulanmıştır. Makroskopik olarak endometriyal kaviteyi kaplayan, serozaya ulaşmış, 4 cm çaplı, nekrotik alanlar barındıran kitle izlenmiştir. Histopatolojik incelemesinde grade 1 endometrioid adenokarsinom alanları yanında yüksek dereceli sarkomatöz komponente sahip karsinosarkom görülmektedir. Kemoterapiye yanıtı olmayan hastada birkaç ay içinde en büyüğü 13 cm çaplı multipl peritoneal metastazlar saptanmıştır.

Sonuç:

Benign veya malign mezenkimal komponent uterin karsinomlara eşlik edebilmektedir. Nadir rastlanması nedeniyle etiyopatogenezi hakkında az bilgiye sahip olduğumuz uterin karsinosarkomun monoklonal mülleryan orjinli olduğu, karsinomatöz komponentin metaplazisi sonucu oluştuğu veya kollüzyon tümör şeklinde bifazik olarak geliştiği düşünülmüştür. Daha çok postmenapozal kadınlarda görülmesine rağmen nullipar genç kadınlarda da görülebilir. Heterojenitesinden dolayı materyallerden mümkün olabildiğince geniş örnek alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Uterus, Karsinosarkom, Stromal metaplazi