

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Jinekopatoloji

EPS352(931)

İyideki kötü: matür teratomlarda gelişen maligniteler - 2 olgu sunumu

Hanife Ozkayalar¹, Fikret Dirilenoğlu¹, Gamze Mocan¹

¹ Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ: Over germ hücre kökenli tümörlerinin en sık görüleni matür teratomlar, genellikle çocukluk çağında görülürler. Matür teratomlar; endoderm, mezoderm ve ektoderm olmak üzere üç germ yaprağından gelişirler. Çoğunlukla benign tümörler olmalarına rağmen %1-2 gibi düşük oranda malign komponent içerebilirler. Malign komponent içeren teratomlar, klasik teratomlara göre daha yaşlı hastalarda görülürler. Literatürde bildirilen vakaların ¾'den fazlası skuamöz hücreli karsinom oluştururken diğer maligniteler (adenokarsinom, papiller karsinom, gliom v.b.) de görülebilir.

OLGU 1: 51 yaşında kadın hastanın, ara kanama nedeniyle başvurduğu jinekoloji polikliniğinde yapılan tetkiklerinde sağ adneksiyel kitle tespit edilmiş ve opere edilmesine karar verilmiştir. Yapılan operasyon ile sağ overde tespit edilen 4cm çapındaki yumuşak kıvamlı kist eksize edilmiş ve dermoid kist ön tanısı ile patoloji laboratuvarına gönderilmiş. Histopatolojik incelemede kistin tamamının tiroid dokusundan oluştuğu ve 0,3 cm çapındaki küçük bir odakta papiller karsinoma ait morfolojik özellikler izlenmiştir. Olgu struma ovarii zemininde gelişen papiller mikrokarsinom olarak raporlanmıştır.

OLGU 2: 39 yaşında kadın hasta sağ alt kadran ağrısı nedeniyle acil servise başvurmuş ve tetkiklerinde sağ overde 6 cm çapında kist tespit edilmesi üzerine acil operasyona alınmış. Sağ overden 6 cm çapında kist eksize edilmiş ve matür teratom ön tanısı ile patoloji laboratuvarına gönderilmiş. Kistin histopatolojik incelemesinde epidermis, dermis ve deri eklerine ait yapıların yanı sıra 1,5 cm çapında mikroinvaziv skuamöz hücreli karsinom odağı dikkati çekmiştir.

SONUÇ: Benign kistik teratomlarda malign transformasyon %1-2 gibi düşük oranda görülür. En sık görülen malignite skuamöz hücreli karsinom olmasına rağmen diğer malign tümörlerde görülebilir. Teratomun beklenenden daha yüksek yaş grubunda tespit edildiği durumlarda malignite gelişme olasılığı nedeniyle daha fazla örnekleme ile daha dikkatli makroskopi ve mikroskobik inceleme yapmalıyız.

Anahtar Kelimeler : matür teratom malignite ileri yaş