

# 27. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

## Poster Sunum

### Dermatopatoloji

#### PS616

### MALİGN MELANOM VE NK/T HÜCRELİ LENFOMA BİRLİKTEİLİĞİ GÖSTEREN OLGU: 1 OLGU SUNUMU

Deniz Tunçel<sup>1</sup>, Nedim Polat<sup>2</sup>, Seyhan Hasçıçek Özakkoyunlu<sup>1</sup>, Fatih Irmak<sup>3</sup>, Rabia Doğukan<sup>1</sup>, Fevziye Kabukçuoğlu<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Suam, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

<sup>2</sup>Polat Patoloji Laboratuvarı

<sup>3</sup>Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Suam, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

#### Giriş

Deride malign melanom ve lenfoma birlikteliği nadir görülmekle birlikte birbirlerini tetikleyen mekanizmalar olduğu literatürde bildirilmiştir.

#### Olgu

77 yaşındaki erkek hastada sağ ayaktan alınan eksizyonel biyopsi örneğinde iki komponent içeren malign tümöral oluşum görülmektedir. Birinci component iri, pleomorfik, veziküler nükleuslu, eozinofilik nükleollü, geniş eozinofilik sitoplazmalı, poligonal şekilli atipik hücrelerden oluşmakta olup diğer komponent diffüz dağılım gösteren, hafif iri, pleomorfik nükleuslu, nükleu konturları belirgin, ince kromatin ve dar sitoplazmalı lenfoid hücrelerden oluşmaktadır. Uygulanan immünohistokimyasal çalışmada neoplastik hücreler S100, HMB-45 ve Melan A ile boyanma göstermiş olup ikinci komponentte CD 56 ve CD 2 ile boyanma saptanmıştır. CD 3, S100, Melan A, Granzim, Perforin ve CD 30 ile boyanma gözlenmemiştir. Ki-67 proliferasyon indeksi bu komponentte %60-70 oranındadır. Histopatolojik tablo ve immünohistokimyasal bulgular ışığında birinci komponent malign melanom, ikinci komponent agresiv NK/T hücreli lenfoma olarak değerlendirilmiştir.

#### Sonuç

Özellikle malign melanom ve NK/T hücreli lenfoma beraberliği deride ender olduğu için olgu sunulmuştur.

**Anahtar Kelimeler :** Malign, melanom, lenfoma