

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Jinekopatoloji

EPS306(431)

Paratubal Bölgede Ektopik Sürrenal Dokusu : Olgu Sunumu

Elif Ocağ Gedik¹, Ahmet Boduroğlu¹, Hadice Elif Peştereli¹, Hasan Aykut Tuncer²

¹ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

² Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

GİRİŞ

Ektopik sürrenal korteks dokusu nadir bir oluşum olup özellikle erkek çocuklarda, genel olarak böbrek çevresinde, retroperitoneal alanda, spermatik kordda ve paratestiküler bölgede görülür. Nadiren erişkinlerde de tanımlanmıştır. Kadınlarda görülme sıklığı oldukça düşüktür. Genellikle histerektomi materyallerinde rastlantısal olarak saptanır.

OLGU

42 yaşında kadın hasta, menometroraji şikayeti nedeniyle polikliniğe başvurdu. Yapılan endometriyal küretaj sonrası atipik hiperplazi/EIN (endometriyal intraepitelyal neoplazi) içeren endometriyal polip saptanması ve ultrasonografik saptanan ovaryan kist nedeni ile hastaya total abdominal histerektomi + bilateral salpenjektomi + kistektomi + omentum biyopsi yapıldı. Makroskobik incelemede endometriyum diffüz kalınlaşmış olup 1,4 cm kalınlıkta ölçülmüştür. Bilateral tubalarda makroskobik lezyon izlenmemiştir. Mikroskobik incelemede EIN/atipik hiperplazi izlenen endometriyal polip, adenomyozis, intramural yerleşimli 2 adet leiomyom yanı sıra paratubal bölgede ektopik sürrenal dokusu izlenmiştir.

SONUÇ

Ektopik sürrenal dokusu, kadınlarda az rastlanan, genellikle insidental olarak, başka nedenler ile çıkarılmış uteruslarda görülen bir lezyondur. Olgu az görülmesi ve dikkatli incelenmezse gözden kaçabilecek bir lezyon olması nedeni ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler :Ektopik, sürrenal, paratubal bölge