

# 27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

## Poster Sunum

### Baş ve Boyun Patolojisi

PS111

### İNTRANAZAL PLEOMORFİK ADENOM: NADİR OLGU SUNUMU

Funda Çalışkan Şenköy<sup>1</sup>, Feyza Demir<sup>1</sup>, Remzi Erten<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Van

#### Giriş

Tükrük bezlerinin tümörleri baş-boyun tümörlerinin %3'ünü oluşturmaktadır. Pleomorfik adenom daha çok major tükrük bezlerinde görülür, vakaların ancak %8'i minör tükürük bezleri lokalizasyonludur. Pleomorfik adenom boyun, kulak, mediasten gibi değişik anatomik bölgelerde izlense de intranasal, maksiller sinüs ve nazofarenks gibi üst solunum yolları lokalizasyonu oldukça nadirdir.

#### Olgu

Burun kanaması şikayeti ile polikliniğe başvuran elliiki yaşındaki erkek hastaya uygulanan paranazal bilgisayarlı tomografide sol nazal kaviteyi dolduran, maksiller sinüs medial duvarını belirgin biçimde incelten 4 cm'lik yumuşak doku kitle lezyon saptanmıştır. Parçalı halde gelen eksizyonel biyopsinin histopatolojik incelemesinde; miksoid stroma içerisinde epitelyal ve myoepitelyal hücreler ile dōşeli duktal yapıların oluşturduğu yer yer küçük selüler adalar, solid adalar ve anastamozlaşan trabeküler alanlar dikkati çekti. İmmünohistokimyasal inceleme eşliğinde olgu "Pleomorfik adenom" olarak raporlandı.

#### Sonuç

İntranazal lokalizasyon; pleomorfik adenomlar için oldukça nadirdir. Bu nadir lezyonlar daha çok nazal septumdan köken alırlar. İntranazal pleomorfik adenomlar; 3-5. dekadlarda, erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Hastalarda daha çok tek taraflı nazal obstrüksiyon şikayeti vardır, daha az sıklıkta burun kanaması ile prezente olur. Benign lezyon olmasına rağmen literatürde malign transformasyon gelişebileceği bildirilmiştir. Ayrıca epitelyal komponentte görülen malign transformasyon metastaz potansiyeli de taşımaktadır. Tedavisi total eksizyondur; stromal elemanların baskın görüldüğü lezyonlarda rekürrens insidansı daha sıktır. Olgumuz lokalizasyon açısından nadir görülen bir lezyon olup, elliiki yaşında erkek hastada burun kanaması ile prezente olması da dikkat çekicidir. Bununla beraber sık intranasal lokalizasyonlu neoplastik ve inflamatuvar lezyonlar ile ayırıcı tanıya girmektedir.

**Anahtar Kelimeler :** Pleomorfik adenom, intranasal lokalizasyon