

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Poster Sunum

Baş ve Boyun Patolojisi

PS116

NAZAL TİPTE PLEKSİFORM NÖROFİBROM

Gülfidan Öztürk¹, Ünsal Han¹, Eşref Demir¹, Emel Çadallı Tatar²

¹Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü

²Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği

GİRİŞ

Pleksiform nörofibrom; benign periferik sinir kılıfı tümörüdür. Baş-boyun bölgesinde özellikle nazal tipte nadir görülmektedir (1-2). Pleksiform nörofibromlar, Nörofibromatozis 1(NF1) olguları için patognomik kabul edilmekle birlikte izole pleksiform nörofibromlar görülebilir.

OLGU

6 yaşında kız çocuğu. Kulak burun boğaz polikliniğine 5-6 aydır olan burun ucunda şekil bozukluğu ve ağrısız şişlik şikayeti ile başvurmuştur. Travma öyküsü bulunmamaktadır. Spesmenin makroskopik incelenmesinde belirgin kapsül içermeyen gri beyaz renkli düzensiz yüzeyli dokular izlendi. Histopatolojik incelemede miksoid zeminde uzamış içsi hücrelerden oluşan iyi sınırlı girdapvari görünümde multiple nodüler lezyon dikkati çekti. Atipi, mitoz ve nekroz izlenmedi. İçsi hücreler S100 ile pozitif olup EMA ile boyanma saptanmamıştır. Pleksiform nörofibrom tanısı konulan olguda nörokutanöz sendromlar açısından klinik araştırma önerilmiştir.

SONUÇ

Pleksiform nörofibrom; nazal tip bölgesinde çok nadir görülür. Kapsüllü olmayan pleksiform nörofibromlar lokal diffüz gelişim gösterebileceğinden rekürrens görülebilir. Malign transformasyon oranı düşüktür (1-2). Olgumuzda nazal tip bölgesi pleksiform nörofibrom için nadir bir lokalizasyon olmakla beraber bu bölgede içsi lezyonlarda ayırıcı tanıda akılda bulunması gerektiğini hatırlatmak için paylaşılmıştır.

KAYNAKLAR

1-Rameh C, Husseini S, Tawil A, Fuleihan N, et al. (2007) Solitary Plexiform Neurofibroma of the Nasal Tip: Case Report and Review of the Literature. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra, 2, 116- 119. <http://dx.doi.org/10.1016/j.pedex.2007.03.003>

2-Nataraj R.V, Jagade M, Parelkar K, Hanawte R, et al. (2015) Plexiform Neurofibroma of Nasal Tip. International Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, 4, 423-428. <http://dx.doi.org/10.4236/ijohns.2015.46068>

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Anahtar Kelimeler : Pleksiform, Nörofibrom, Nazal tip