

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Poster Sunum

Jinekopatoloji

PS020

VULVADA EKTOPIK MEME DOKUSU,NADİR LOKALİZASYON

Serdal Sadet Özcan¹, Ebru Akay¹, Fatoş Tekelioğlu¹, Hatice Karaman¹

¹Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş

Konjenital bir anomali olan ektojik meme dokusu genel popülasyonun %0.6-6 arasında görülmektedir.Ektojik meme dokusuna aksilladan kasiğa kadar süt çizgisinin herhangi bir yerinde rastlanmakta olup,memenin benign ve malign hastalıkları görülebilmektedir.Olguların çoğu asemptomatiktir ancak gebelik gibi hormonal değişikliklerden etkilenebilmektedir.

Burada vulvada ektojik meme dokusunda Fibrokistik hastalık tanısı alan olgu sunulmaktadır.

Olgu

30 yaşında, gebe ,vulvada giderek artan şişlik nedeniyle kadın doğum kliniğe başvuran hastanın yapılan görüntüleme yöntemlerinden yüzeysel ultrasonografisinde sol labium majusta 5x3x2cm ölçüsünde yer yer kistik mesafelerin izlendiği öncelikle lipom lehine değerlendirilen heterojen kitle tespit edildi.Kliniğimize gönderilen cerrahi spesmenin Hematoksilen&Eozin boyalı histolojik incelemesinde yüzeide vulvaya ait çok katlı yassı epitel altında yerleşim gösteren çift katlı epitel ile dōşeli memeye ait duktus yapıları,arada hyalinize stroma ve apokrin hücre metaplazisinin izlendiği kistik mesafeler izlendi.Bu bulgularla olguya Fibrokistik hastalık deşikliklikleri içeren vulvada ektojik meme doksu tanısı verildi.

Sonuç

Vulvada ektojik meme dokusu tanısı ilk olarak 1872 yılında verilmiş olup günümüze kadar başta Fibrokistik ve Fibroadenom gibi benign hastalıklar olmak üzere malign hastalıkları ile de ektojik dokuda karşılaşılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler : Ektojik meme,Fibrokistik hastalık,vulva