

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Poster Sunum

Jinekopatoloji

PS051

STRUMOZİS Mİ? OVER KAYNAKLI İYİ DİFERANSİYE FOLLİKÜLER KARSİNOM MU (HDFCO)?

Olca Kurtulan¹, Anıl Ertürk², Alp Usubütün³, Gökhan Boyraz⁴, Nejat Özgül⁴, Cenk Sökmensüer³

¹Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi

²Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Abd

³Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Patoloji Abd

⁴Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Abd, Jinekolojik Onkoloji

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne abdominal ağrıyla başvuran 75 yaşındaki kadın hastada, sol overde en geniş çapı 11 cm olan kitle, karında asit ve sağ plevral efüzyon saptandı. CA125 düzeyi 1127 mg/dL idi, tiroid hormonları normal sınırlardaydı. Hastaya total abdominal histerektomi, bilateral salpingooferektomi ve infrakolik omentektomi uygulandı. Frozen sonucu matür kistik teratom olarak sonuçlandı. Olgunun patolojik incelemesinde sol overde matür kistik teratom ile uyumlu multiloküler kistik ve solid kitle izlendi. Omentum ve herni kesesinde iyi diferansiye (nodüler guatrı düşündüren) tiroid folliküllerinden oluşan mikroskopik implantlar izlendi. Bu odaklar HBME-1 ile negatif olup Ki-67 proliferasyon indeksi düşüktü.

Batına yayılmış struma ovarii vakalarında eskiden strumozis tanısı kullanılırken son zamanlarda bu antitenin düşük malignite potansiyelli olduğu bildirilerek "over kaynaklı iyi diferansiye folliküler karsinom" olarak isimlendirilmiştir. Bu olgular malign transformasyon gösteren matür kistik teratomdan daha iyi seyirli olarak bildirilmiştir. Bizim olgumuzun 14 aylık takibinde rekürrens saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : Strumozis, HDFCO, over, teratom