

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Poster Sunum

Jinekopatoloji

PS063

MULTİPLE PLASENTAL CHORANJİOMA (HEMANJİOMA)

Çiğdem Özdemir¹, Esra Şengül¹, Tuğba Kavaklı¹

¹Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ad

Giriş

Plasental choranjiomalar oldukça sık, küçük ve asemptomatik olanları yaklaşık %1 oranında görülmektedir. Fakat büyük yani 5 cm'den daha büyük choranjiomlar daha nadir olup, sıklığı 1/9000-50000 arasında değişmektedir. Choranjiomların çapı büyüdükçe fetus açısından ciddi sonuçlara neden olabilirler; ciddi fetal distresten intrauterin ölüme kadar giden spektrumda.

Olgu

37 yaşında, multipar kadın hasta, gebeliği esnasında düzensiz takipli olup, fetus hareketlerini hissetmemesi üzerine kadın doğum kliniğine başvurmuştur. 38 haftalık fetusun intrauterin exitus olduğu tesbit edilmiştir. Plasentanın makroskopik incelemesinde 2 adet birisi 5,5 cm çapta diğeri 2,5cm çapta birbirine 5 cm uzaklıkta çevre dokudan keskin sınırla ayrılan kanamalı lezyon izlendi. Mikroskopik incelemede CD34 ile diffüz kuvvetli reaksiyon veren, küçük çaplı kapiller yapılardan oluşan, trofoblastik proliferasyon içermeyen tümör görülmüştür.

Sonuç

Plasental choranjiomlar; choranjiomatozis, choranjiomozis ve choranjiokarsinomdan ayırt edilmelidir. Benign olan choranjiomların çapı arttıkça hemodinamik açıdan sorunlara neden olmakta ve fetüsün kaybına kadar giden sonuçlar doğurmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Plasenta, choranjioma