

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Baş ve Boyun Patolojisi

EPS040(408)

Onkositik lipoadenom; parotis bezinin nadir bir tümörü, olgu sunumu

Nilsen Erdoğan¹, Merve Cin², Fatih Tetik³

¹ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Patoloji Bölümü

² Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Patoloji Bölümü

³ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Kulak Burun Boğaz Bölümü

Giriş: Onkositik lipoadenom, parotis bezinin nadir görülen bir tümörü olup en sık parotis bezinde daha az sıklıkla submandibuler bezde, 7 ile 89 yaş arasında geniş bir yaş aralığında ve her iki cinsiyette de görülür.

Olgu: Olgumuz 54 yaşında sol parotiste 4 yıl süresince yavaş büyüyen ağrısız kitle şikayeti ile başvuran erkek hastadır. Radyolojik incelemede magnetik rezonans görüntülemeye parotis yüzeysel lobdan derin loba uzanımı seçilen yağlı sekanslarda baskılanma gösteren ancak inferioru kontrastlanan 4,5x4 cm ölçülerinde iyi sınırlı kitle lezyon saptanan olguya sol süperfisyal paratidektomi uygulandı. Makroskopik olarak 6x4,5x3cm ölçülerindeki paratidektomi piyesinin kesitinde 4,5x4 cm ölçülerinde enkapsüle görünümde kendi içinde lobülasyon gösteren gri-sarı renkli adipöz doku izlenimi veren iyi sınırlı bir alan izlendi. Mikroskopik olarak bu alan ince fibröz bağ dokusundan bir kapsül ile çevrili olup matür adipöz doku ve bol granüler sitoplazmalı onkositlerden oluşmaktaydı. Adipöz doku ve onkositlerde atipi veya mitotik aktivite saptanmadı. Olguda mevcut histomorfolojik bulgularla "onkositik lipoadenom" tanısına ulaşıldı. Olgu 25 aydır takipte olup ve nüks saptanmadı.

Sonuç: Onkositik lipoadenoma, tükürük bezlerinde yeni tanımlanan, son derece nadir görülen ve ilk olarak Hirokawa tarafından 1998 yılında bildirilen bir tümördür. Nadir görülmeleri nedeniyle onkositik lipoadenomalar fazla yağ içeriği bulunan pleomorfik adenom gibi tükürük bezi tümörleri; onkositik komponent içeren tümörleri veya nadir de olsa belirgin onkositik metaplazi gösteren epitelyel-myoepitelyal karsinoma ve myoepitelyoma gibi tükürük bezi tümörleri ile karışabilirler. Bu nedenle ayırıcı tanıda histomorfolojik ve immünohistokimyasal özellikleri ile ayrıntılı değerlendirilmeleri doğru tanıya ulaşmayı sağlar.

Anahtar Kelimeler : parotis bezi, lipoadenom, onkositler