

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Jinekopatoloji

EPS303(646)

VULVADA EKTOPIK MEME DOKUSU KAYNAKLI İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM: OLGU SUNUMU

Burcu Kemal Okatan¹, Nilüfer Çetinkaya Kocadal², Ayten Livaoğlu¹, Hatice Küçük¹

¹ Sbü Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi ,patoloji Bölümü, Trabzon

² Sbü Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi ,jinekolojik Onkoloji Bölümü, Trabzon

GİRİŞ

Vulvanın adenokarsinomu nadir olup meme benzeri adenokarsinomları çok çok nadirdir. Bunlar vulvadaki ektojik meme dokusundan kaynaklanmaktadır. Olgumuzda vulvar kitle nedeniyle kadın doğum polikliniğine başvuran hastaya buradaki ektojik yapıdan kaynaklanan primer invaziv duktal karsinom tanısı konulmuştur.

OLGU

Vulvar kitle nedeniyle kadın doğum polikliniğine başvuran 53 yaşında bayan hastaya yapılan punch biyopsi sonucu dış merkezde skuamöz hücreli karsinom tanısı konulmuş, eksizyon önerilmiştir. Bölümümüze gelen eksizyon materyalinde 1 cm lik yüzeyi ülser nodüler gri-beyaz sert tümöral lezyon izlendi. Mikroskopik olarak yüzeyde ülserasyon gösteren epitel altında nodüler tarzda malign neoplazm izlendi. Neoplazmda belirgin yuvalanma , duktal yapılar halinde invazyon gösteren orta derecede pleomorfizm , sık mitoz aktivite içeren hücreler dikkati çekti. Ayrıca komedokarsinom (yüksek dereceli karsinoma in situ) odağı da mevcuttur.

İmmünohistokimyasal çalışmada : ER % 100 kuvvetli pozitif (+++), PR % 60 orta şiddette pozitif (++), c-erb B2 (+2) pozitif , e-kadherin (+), EMA (+) , CK7 (+) , CK20 (-) , HMWCK fokal zayıf (+), Kromogranin (-) , Sinaptofizin (-) , CA125 (-) , HMB45 (-) , Melan A (-) , S-100 (-) , BereB4 (-) , CEA zayıf fokal (+) , P63 (-) sonuç vermiştir. GCDP15 ile anlamlı boyanma gözlenmemiştir. Ki-67 ile proliferasyon indeksi % 15-20 oranındadır.

Olguda morfolojik ve İHK bulgular göz önüne alındığında neoplazmın meme gland benzeri adenokarsinom olduğu düşünülmüştür.

SONUÇ

Vulvanın meme dokusu kaynaklı adenokarsinom çok nadir görülmektedir. Vulvadaki ektojik meme benzeri glandlardan kaynaklanmaktadır. Bazı hastalarda BRCA mutasyonu saptanmıştır. Genellikle post menapozal dönemde görülmektedir. Bunlar genellikle invaziv duktal karsinom şeklindedir ve insitu duktal komponent içerebilirler. Vulvanın apokrin karsinomlarından ve meme karsinomu metastazından

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



ayrılmalıdır. Memede odak olmaması halinde primer olarak nitelendirilebilir. Olgumuzda da öncelikle metastaz açısından meme araştırılmıştır. Memede odak saptanmadığından vulvanın ektopik meme dokusundan gelişmiş primer invaziv duktal karsinomu olarak kabul edilmiştir. Vulvada görülen adenokarsinomlarda duktal karsinom nadir görülmesi nedeniyle akılda tutulmalıdır

Anahtar Kelimeler : Vulva, invaziv duktal, meme benzeri gland