

# 28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji  
Dernekleri  
Federasyonu



Ankara  
Patoloji  
Derneği



## E-Poster

### Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi

#### EPS379(728)

#### Periosteal kondrom: Ayırıcı tanı zorluğu oluşturan nadir bir kıkırdak lezyonu

Elif Kolay<sup>1</sup>, Nil Tokgöz<sup>2</sup>, Güldal Esendağlı<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

<sup>2</sup> Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Radyoloji Anabilim Dalı

**Giriş:** Periosteal kondrom, kondromların yaklaşık %2'sini oluşturan ve enkondromdan çok daha nadir görülen benign bir kıkırdak tümörüdür. Sıklıkla uzun kemiklerde yerleşim göstermekle birlikte kısa tübüler kemiklerde de görülebilir. Kemik korteksin yüzeyinde, periostun altında ya da periost içerisinde geliştiğinden kemik korteksi erode edebilir. Radyolojik olarak, kortekste keskin sınırlı erozyonlar yaratan radyolusen ya da mineralize kemik yüzey tümörü olarak izlenirler.

**Olgu:** Olgumuz 49 yaşında kadın hasta olup sağ ayak 2. web aralığında şişlik nedeniyle ortopedi kliniğine başvurmuş. Dış merkez manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) gangliyon kisti ile uyumlu olarak raporlanan kitlesel lezyona ait küretaj materyali düzensiz doku fragmanları halinde olup asit takibi sonrasında yapılan histopatolojik incelemede hyalin kartilaj matriks içerisinde lakünlerde yerleşmiş, mitotik aktivite ya da atipi göstermeyen kondrositler ile karakterize kondroid tümör izlendi. İmmünohistokimyasal olarak tümörde Ki67 ve PHH-3 ile belirgin bir proliferatif aktivite saptanmadı. Dış merkez MRG'si merkezimizdeki radyoloji bölümünde olguya ait direkt grafi ile birlikte yeniden incelendiğinde, radyolojik bulgular benign kıkırdak tümörü ile uyumlu olarak yorumlandı. Lezyonun anatomik lokalizasyonu, radyolojik ve histopatolojik bulguları birlikte değerlendirildiğinde olguda mevcut kitlesel lezyon, periosteal kondrom ile uyumlu olarak raporlandı.

**Sonuç:** Periosteal kondromun histopatolojik görünümü diğer benign kıkırdak tümörleriyle benzer

# 28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji  
Dernekleri  
Federasyonu



Ankara  
Patoloji  
Derneği



özellik taşıdığından, lezyonun yerleşim yerini ayrıntılı bir şekilde belirlemede yol gösterici olan radyolojik bulgular kesin tanı için önem taşımaktadır. Tedavisinde lokal eksizyonun yeterli olduğu ve lokal rekürrensin oldukça nadir görüldüğü bildirilmektedir. Ayırıcı tanısında her zaman benign-malign ayırımının söz konusu olduğu kıkırdak tümörlerinin değerlendirilmesinde histopatolojik inceleme yanı sıra klinik ve radyolojik bulguların da doğru tanıya ulaşmada oldukça önemli olduğunu vurgulamak amacıyla olgumuzu paylaşmak istedik.

**Anahtar Kelimeler :**periosteal kondrom, enkondrom