

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Poster Sunum

Baş ve Boyun Patolojisi

PS112

PALATIN TONSİLDE LENFANJİOMATÖZ POLİP

Hilal Balta¹, İlknur Çalık¹, Betül Gündoğdu²

¹Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü

²Erzurum Atatürk Üniversitesi Patoloji Bölümü

GİRİŞ

Lenfanjiyomatöz polipoid lezyonlar, lenfatik ve vasküler sistemlerde ortaya çıkar. Ancak histolojik olarak tipik bir lenfatik malformasyondan farklıdır. Bunlar en yaygın olarak alt gastrointestinal sistemde görülür. Baş ve boynun lenfanjiyomatöz polipoid lezyonları çok nadir olup, tonsilde de daha az sıklıktadır. Polipoid lezyonlar, yüzeyi skuamöz epitelle çevrili, çeşitli derecelerde fibröz yapı, dens kollajen, adipöz doku, dilate lenfatik kanallar, lenfoid doku komponentlerinden oluşur.

OLGU

19 yaşındaki erkek hasta, 2 yıldır boğazında yutkunurken takılma hissiyle kulak burun boğaz polikliniğine başvuruda bulunmuş. Yapılan fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri sonrasında operasyona alınmış. Patolojiye gelen spesmen makroskopik incelendiğinde 2x1x0,5 cm ölçülerde, gri esmer renkte bir lezyondu. Mikroskopik incelemede ise lezyon, yüzeyde çok katlı nonkeratinize skuamöz epitel altında stromada geniş dilate lenfatik yapıların komşuluğunda, lenfoid ve adipöz dokudan oluşuyordu.

SONUÇ

Tonsiller lenfanjiyomatöz polipler, nadir görülen benign lezyonlardır. Ancak klinik olarak malign neoplazilerle karışabileceğinden histopatolojik tanı, lezyonun benign natürünü ortaya çıkarmak için önemlidir.

Anahtar Kelimeler : Lenfanjiomatöz polip, tonsil