

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi

EPS418(777)

Non-ossifiye fibrom: 6 olgunun klinikopatolojik özellikleri

Döndü Nergiz¹, Hülya Tosun Yıldırım¹, Dinç Süren¹, Arsenal Sezgin Alikanoğlu¹, Cem Sezer¹

¹ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

GİRİŞ

Non- ossifiye fibrom (NOF) çocuklarda uzun kemiklerin metafizlerinde en sık görülen benign, non-neoplastik bir lezyondur. NOF, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kemik tümörlerinin histolojik sınıflandırmasına göre tumor-benzeri lezyon olarak sınıflandırılır. Biz 6 olguda non-ossifiye fibromun klinikopatolojik özelliklerini araştırdık.

OLGU

3 yıllık bir süre boyunca (2015 - 2018) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı'nda NOF tanısı alan toplam 6 olgu içeren retrospektif bir analizdir. Medyan yaş 17 (dağılım: 9- 25 yaş) idi. Tümör 1 hastada radius, 2 hastada tibia ve 3 hastada femur yerleşimliydi. 1 hasta metafizodiafiz, 4 hasta metafiz ve 1 hasta diafiz yerleşimliydi. Hastaların çoğu asemptomatiktir. (5 hasta) ve 1 hasta ağrı ve şişlik şikayeti ile başvurmuştu. Tüm hastalarda lezyona küretaj yapılmıştı. Lezyonun en büyük çapı ortalama 4,1 (dağılım: 2,5- 5,5)di. Takipleri boyunca hiçbir hastada nüks izlenmedi.

SONUÇ

NOF'un histopatolojik komponentleri değişken olsa da, genellikle oldukça karakteristiktir ve kesin tanıya ulaşmak için klinik ve radyografik korelasyon gereklidir. Dev hücreli tümör ve benign fibröz histiositom ayırıcı tanıda mutlaka akla gelmelidir. Radyografik görünüm, klinik prezentasyon ve histopatolojinin korelasyonu NOF'un ayırıcı tanısında çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler :Non ossifiye fibrom, NOF, Fibröz kortikal defekt, Metafizyel fibröz defekt