

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Gastrointestinal Patoloji

EPS213(804)

Pamukkale Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalının Yedi Olguluk İnflamatuvar Fibroid Polip Serisi

Yeliz Arman Karakaya¹, Neşe Çallı Demirkan¹

¹ Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

AMAÇ

Bu makalenin amacı, kliniğimizde inflamatuvar fibroid polip olgularının klinik, radyolojik, histopatolojik, immünohistokimyasal özelliklerini değerlendirmek ve literatür bilgileri ile karşılaştırmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu retrospektif çalışma 2012 Ocak ve 2018 Temmuz tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalında inflamatuvar fibroid polip tanısı almış olguları kapsamaktadır. Hastaların cinsiyeti, yaş dağılımları, lezyonların lokalizasyonu, semptom varlığı, endoskopi bulguları, histopatolojik ve immünohistokimyasal özellikleri değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Bu çalışmaya inflamatuvar fibroid polip tanısı konulan 7 olgu dahil edilmiştir. Olgularımız 35 ve 85 yaşları arasında olup, yaş ortalaması 63'tür. 5'i kadın, 2'si erkektir. 5'i mide, 1'i kolon, 1'i ince barsak yerleşimlidir. Bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetleri nedeniyle yapılan endoskopik incelemede 4'ünde endoskopik biyopsi, BT'de kitle görünümü nedeniyle 2'sinde subtotal gastrektomi 1'inde ince barsak rezeksiyonu uygulanmıştır. Tümörlerin en büyüğünün boyutu 6.2 cm, en küçüğünün boyutu 0.4 cm'dir. Mideden alınan 3 olgu mide antrum yerleşimli olup, polip ön tanısı ile endoskopik biyopsi gönderilmiştir. Normal mide mukozasında kronik gastrit eşlik etmekte olup, birinde mukoza ülseridir. 6 cm ve 3 cm çaplı 2 mide olgusunda malign öntanısı ile subtotal gastrektomi uygulanmıştır. Crohn hastalığı olan 2 yıldır takipli hastaya mekanik obstrüksiyon nedeniyle ince barsak rezeksiyonu ve sağ hemikolektomi uygulanmıştır. Kolon mukozasında lenfoid folliküller, çok sayıda granülom yapısı ve disseke edilen lenf nodlarında granümatöz lenfadenit izlenmektedir. Histopatolojik olarak tüm olgularımız benzer özellikler göstermektedir. Genel olarak submukozal yerleşimli, belirgin atipi ve mitoz göstermeyen uniform görünümde içi hücrelerden oluşan tümöral oluşum izlenmektedir. İçi hücreler arasında yoğun eozinofil, plazma hücreleri ve lenfositlerden oluşan mikst tipte iltihabi hücre infiltrasyonu ile vasküler proliferasyon, perivasküler konsantrik halka gösteren alanları vardır. İmmünohistokimyasal incelemede tümöral hücrelerde Vimentin, CD34 pozitif, CD117, Desmin, SMA, DOG-1, S-100, ALK, B-katenin negatif boyanma göstermiştir. Ki-67 proliferasyon indeksi ise yaklaşık %1-2'dir.

SONUÇ

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



İnflamatuvar fibroid polipler benign tümörler olup, genellikle rekürrens yada metastaz görülmez. Büyük boyutlarda görüldüğünde GİST ile karıştığı için total rezeksiyon sıklıkla gereklidir.

Anahtar Kelimeler : inflamasyon, polip, kitle