

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi

EPS399(935)

Maksiller sinüs lipomu: Olgu sunumu

Tuba Oğuzsoy¹, İpek Erbarut Seven¹, Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan², Caner Kaya², Sergülen Dervişoğlu³

¹ Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

² Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

³ İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ,tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ

Lipomlar matür yağ dokusundan oluşan, sellüler atipi içermeyen tümörlerdir. Sıklıkla subkütanöz dokuya yerleşmekle birlikte intramüsküler, retroperitoneal bölge ve nadiren interosseöz ve intraosseöz bölgede de ortaya çıkabilirler. İntraosseöz lipomlar oldukça az oranda görülmektedirler. Sıklıkla alt ekstremitelerde uzun kemiklere yerleşirken daha az oranda kraniofasyal bölgeye yerleşirler.

OLGU

15 yaşında erkek hasta, 1 sene önce çekilen kranial bilgisayarlı tomografi sonucunda insidental olarak saptanan maksiller sinüs yerleşimli kitle nedeniyle opere edildi. Makroskopik olarak düzensiz sınırlı, 3x2.5x1 cm boyutlarında diffüz sarı renkli yağlı doku parçası izlendi. Mikroskopik incelemede kapsülsüz, atipi içermeyen, geniş poligonal, berrak sitoplazmalı, periferik yerleşimli nukleuslu, matür adipositlerden oluşan lezyon izlendi. Olgu maksiller sinüs lipomu olarak raporlandı.

SONUÇ

İntraosseöz lipomlar tüm lipomların % 0.1' inden daha azını oluşturmaktadırlar. Milgram'ın 1987 yılında yapmış olduğu 66 serilik intraosseöz lipom vakalarının, %35'i proksimal femur, %8'i kalkaneus yerleşimliken yalnızca 2 vaka kraniofaringial yerleşimli olarak değerlendirilmiştir. Kraniofaringial yerleşimli lipomların etiyojileri kesin olarak bilinmemekle birlikte, iskemi, nekroz ve travmalara bağlı gelişebileceği düşünülmektedir. Bu tümörlerin ayırıcı tanısına lokalizasyonlarından dolayı klinik ve radyolojik olarak fibroz displazi, metastazlar ve odontojenik tümörler alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler :Lipom, İntraosseöz bölge, Maksiller sinüs