

Poster Sunum

Dermatopatoloji

PS629

OLGULARLA OTOİMMÜN BÜLLÖZ HASTALIKLARIN DERMATOLOJİK İMMÜNOFLORESAN VE HİSTOMORFOLOJİK BULGULARI

Münire Çağın¹, Deniz Ateş Özdemir², Fatma Aksoy Khurami¹, Betül Erdem³, Müzeyyen Gönül³

¹Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

²Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

³Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

GİRİŞ: Vezikülobüllöz hastalıklar, epidermis veya dermoepidermal bileşkenin herhangi bir düzeyinde vezikül veya bül formasyonu oluşturan hastalıklardır. Bül oluşum mekanizmasına, ayrışmanın seviyesine ve inflamasyonun niteliğine göre alt gruplara ayrılır. Bu bildiride kliniğimizdeki vezikülobüllöz hastalıklardan farklı tanılara sahip dört olguyu sunmayı amaçladık.

OLGU: 1.Olgu: 47 yaşında kadın hastanın vücudunda , oral ve anal mukozada yer yer büllöz , yer yer ekzoriye lezyonları mevcuttu, biyopsi alındı. Kesitlerde suprabazal ayrışma ve fokal bir alanda izlenebilen epidermiste spongiyoz, akantoz, bazal vakuoler dejenerasyon izlendi. Anal mukozadan alınan biyopside ise intraspinoz akantoliz ve ayrışma görüldü. Her iki biyopside dermiste eozinofil lökositlerin eşlik ettiği perivasküler ve interstisyel lenfositler inflamasyon mevcuttu. Direkt immunofloresan(DİF) incelemede IgG ile perisellüler immunoflorans elde edildi.

2.Olgu: 32 yaşında kadın hasta tüm vücutta eritemli zeminde yer yer birleşme eğiliminde intakt bül şeklinde bazılarının üzeri kurutlu ve erode lezyonları mevcuttu. Alınan biyopside epidermiste eozilofilik spongiyoz yanısıra bir alanda akantoliz komşuluğunda suprabazal ayrışma izlendi. Yüzeysel ve derin dermiste eozinofil lökositlerden zengin infiltrat görüldü. DİF incelemede IgG ile bazal tabaka keratinositlerinde daha fazla olmak üzere perisellüler immüno florans elde edildi.

3.Olgu: 84 yaşında erkek hasta tüm vücutta 1 aydır kaşıntılı erode alanlar ve son 2-3 haftadır büllöz lezyonları mevcuttu. Alınan ilk biyopside epidermiste ekzoriyasyon ve dermiste perivasküler ve interstisyel eozinofillerin eşlik ettiği lenfositler inflamasyon, ikinci biyopside subepidermal ayrışma ve eozinofiller DİF incelemede IgG ve C3 ile dermoepidermal bileşkede lineer immüno florans elde edildi.

4.Olgu: 61 yaşında çölyak tanılı kadın hastanın vücutta veziküler kaşıntılı lezyonlarından alınan biyopside epidermiste hafif spongiyoz ve subepidermal ayrışma izlendi. Ayrışma alanında fibrin içinde az sayıda eozinofil lökosit içeren polimorfonükleer lökositler izlendi. DİF incelemede IgA ile dermoepidermal bileşkede granüler immüno florans elde edildi.

1.olgu pemfigus herpetiformis , 2.olgu pemfigus vulgaris , 3.olgu büllöz pemfigoid , 4.olgu dermatitis herpetiformis olarak değerlendirildi.

SONUÇ: Vezikülobüllöz bir hastalık biyopside bazen sadece ekzoriyasyon yada ayrışma öncesi papüller

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

ürtikeryal fazda sadece inflamasyon şeklinde prezente olabilir. Vezikülobüllöz lezyonun kesin teşhisi dikkatli dermatolojik, histolojik ve immünofloresan inceleme ile mümkündür.

Anahtar Kelimeler : otoimmün büllöz, direkt immünofloresan, vezikülobüllöz