

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Poster Sunum

Baş ve Boyun Patolojisi

PS087

TONSİLDE KARTILAJİNÖZ KORİSTOM

Naile Kökbudak¹, Pembe Oltulu², Ayşenur Uğur Kılınc²

¹Konya Numune Hastanesi

²Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Giriş

Heterotopi ya da koristom mikroskobik olarak normal olan hücre ya da dokuların anormal lokalizasyonlarda bulunması demektir. Heterotopik artıkların klinik önemi genellikle azdır ancak görünümüne bağlı olarak neoplazilerle karıştırılabilir.

Olgu

6 yaşında erkek çocuk tekrar eden boğaz ağrısı ve ateş şikayetiyle kulak burun boğaz hastalıkları polikliniğine başvurmuş. Uygulanan medikal tedavilere rağmen rekürrensler devam edince tonsillektomiye karar verilmiş. Tonsillektomi sonrasında laboratuvarımıza 2 adet büyüğü 2,6 cm, küçüğü 2,5 cm çapında gri kahverenkli yuvarlakça tonsil materyalleri gönderildi. Histolojik incelemede lenfoid hiperplazi ve kronik iltihap bulguları izlendi. Epitel altında yaklaşık 0,1 cm çapında kartilaj doku tespit edildi. Bunun üzerine materyalin tamamı örneklendi ancak başka bir alanda kartilaj doku saptanmadı. Olgu bu haliyle Tonsilde Kartilajinöz Koristom tanısı aldı.

Sonuç

Kartilaj doku içeren koristom genellikle ellerde ve ayaklarda görülürken oral kavitede nadir olarak görülmektedir. Çeşitli lokalizasyonlarda olabilir ama oral kavitede en sık dilde yerleşimlidir. Tonsilde kartilajinöz koristom genellikle genç erişkinlerde, ağırlıklı olarak kadınlarda ağrısız kitleler şeklinde görülür. 2.faringeal arkusun gelişimsel anomalisidir ve tekrarlayan tonsillitlere sebep olabilir. Tonsillerde yerleşimi nadir olan bu olgu literatür bilgileri ışığında sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : koristom, tonsil, kartilaj