

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Poster Sunum

Gastrointestinal Patoloji

PS270

İKİ GASTRİK LİPOM OLGUSU

Sirin Küçük¹, İzzet Göker Küçük²

¹Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü / Uşak

²Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi / Uşak

Lipomlar benign adipoz dokudan kaynaklanan mezenkimal orijinli tümörlerdir. Midede nadir bulunurlar (1-7,11-14). Genellikle submukozal yerleşimlidir (2,3,5). Mide lipomlarının 2 cm'den küçük olanları asemptomatik olup büyük olanlar ise kanama, obstrüksiyon, kusma ve ağrı gibi semptomlara neden olur (1,3,5,10-14). Endoskopik biyopsiler esnasında rastlantısal olarak bulunup rezeksiyon veya subtotal gastrektomi ile tedavi edilir (3,11). İlk hasta dispeptik ve üst gastrointestinal kanama (melena) şikâyetleriyle başvuran 77 yaşındaki erkek hasta. Hastanın endoskopik incelenmesinde antrum yerleşimli obstrüksiyon ve mukozal düzensizlik yapan 3 cm çapında kitle tariflendi. İkinci hastamız da benzer şekilde dispeptik yakınmalarla kliniğe başvuran 65 yaşında kadın hasta. Hastanın yapılan endoskopik incelenmesinde mide korpus antrum bileşkesi yerleşimli 2,5-3 cm çapında ortası hafif çökük kitle tariflendi. Her iki olguyada subtotal gastrektomi yapıldı. Materyallerin histopatolojik incelenmesi sonucunda olgulara gastrik lipom tanısı verildi. Bu makalede nadir görülen gastrik lipom tanısı alan iki olgunun klinikopatolojik bulgularının literatür bilgileri eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : Gastrik lipom, subtotal gastrektomi, dispepsi