

# 27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

## Poster Sunum

### Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi

PS384

### ANJIOSARKOM TAKLİTÇİSİ PAPİLLER ENDOTELYAL HİPERPLAZİ (MASSON TÜMÖRÜ): OLGU SUNUMU

Remzi Erten<sup>1</sup>, Feyza Demir<sup>1</sup>, Zehra Akman İlik<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Van

#### Giriş

Papiller endotelyal hiperplazi; anjiyosarkomu taklit edebilen, genellikle intravasküler abartılı endotelyal bir proliferasyondur. Nadir görülen organize bir trombus varyantı olarak kabul görmüştür. İlk olarak Masson tarafından tanımlanmıştır.

#### Olgu

Dermatoloji polikliniğine 4-5 aydır sol avuçta ağrılı yara şikayeti ile başvuran 36 yaşındaki bayan hastanın fizik muayenesinde sol el tenar bölgede hemanjiom ile uyumlu ciltten kabarık 2x0,5 cm ölçüsünde kitle izlenmiştir. Yüzeysel doku ultrasonografisinde sol el tenar bölgede cilt altında 21x6 mm ebatlı hemanjiom ile uyumlu lezyon izlenmiştir. Yapılan eksizyonel biyopsinin makroskopik incelemesinde deri üzerinde; 1,3x1,2x0,5 cm ölçüsünde bordo renkte nodüler bir yapı izlendi. Lezyonunun kesit yüzü bordo renkte kanamalı görünümde idi. Mikroskopik incelemede kesitlerde intravasküler yerleşimli endotel hücreleri ile döşeli ortalarında hiyalen kor içeren papiller yapılar izlendi. Yer yer tromboze ve rekanalize alanlar görüldü. Endotel hücrelerinde mitoz ve atipik mitoz, lezyonda nekroz izlenmedi. Histopatolojik bulgular eşliğinde olguya "Papiller endotelyal hiperplazi (Masson tümörü)" tanısı verildi.

#### Sonuç

Masson tümörü deri ve yumuşak dokudaki vasküler tümörlerin yaklaşık %2'sini oluşturur. Genellikle kadınlarda her yaşta görülebilir. Özellikle baş, boyun ve ekstremitelerde görülür. Histopatolojik olarak damar lümenlerinde trombus odakları içeren papiller yapılardan oluşan vasküler bir lezyondur. Genellikle vasküler hasara sekonder reaktif nonneoplastik bir süreç sonucu oluşur. Ayırıcı tanısında hemanjiom, vasküler malformasyonlar, piyojenik granülom, epitelooid hemanjiyoendotelyoma, anjiyosarkom, Kaposi sarkomu ve daha nadir görülen vasküler tümörler de düşünülmelidir. Bu ayırıcı tanıların içinde anjiyosarkom gibi agresif tümörlerin varlığı; Masson tümörü doğru tanısının ne kadar hassasiyet gerektirdiğini göstermektedir.

**Anahtar Kelimeler :** Masson tümörü, papiller endotelyal hiperplazi, anjiyosarkom