

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Poster Sunum

Jinekopatoloji

PS043

ENDOMETRİAL KARSİNOM OLGUSUNDA İNSİDENTAL SAPTANAN ADENOMATOİD TÜMÖR

Ayşe Nur Uğur Kılınç¹, Fahriye Kılınç¹, Sıddıka Fındık¹, Pembe Oltulu¹

¹Necmettin Erbakan Üniversitesi

Giriş

Adenomatoid tümörler mezotelyal kökenli benign lezyonlardır. Genellikle kadın ve erkek genital traktı üzerinde izlenir.

Olgu

54 yaşında bayan hastaya endometrial karsinom ön tanısı ile histerektomi yapıldı. Histerektomi materyalinde kaviteyi doldurmuş yaklaşık 3X2.5X2 cm ölçülerinde tümöral yapı izlendi. Ayrıca myometriyum içerisinde 2 adet ve subserozal yerleşimli 1 adet 1 cm çapında yuvarlakça myomatö görünümlü lezyonlar izlendi.

Dokuların histopatolojik incelemelerinde kavite içerisindeki lezyonda grade 2 endometrioid tip adenokarsinom saptandı. İntramural yerleşimli lezyonlar leiomyom ile uyumlu iken subserozal yerleşimli lezyonun kesitlerinde diğerlerinden farklı olarak tek sıralı kübik epitel ile döşeli küçük kistik yapılar oluşturmuş nodüler lezyon görüldü. İmmünohistokimyasal çalışmalarda bu lezyonun kalretinin ile diffüz pozitif, pansitokeratin, desmin, SMA ile negatif olduğu izlendi. Bu bulgularla adenomatoid tümör tanısı konuldu.

Sonuç

Adenomatoid tümör mezotelden köken alan benign bir neoplazidir. Uterusta intramural olmaktan çok subserozal yerleşim gösterdiklerinden biyopsi ya da küretaj materyali ile tespit edilmeleri çok olası değildir. Bu tümörler çoğunlukla insidental olarak saptanır ve boyutları 0.2-10 cm arasında değişir. Makroskobik olarak leiomyoma benzer görüntüsü mikroskobik olarak dejenere leiomyom olarak yorumlanmasına sebep olabilir. Olgumuzda da endometrial karsinom tanısı ile opere edilmiş histerektomi materyalinde subserozal yerleşimi nedeni ile insidental olarak saptanan ve gros olarak myomu anımsatan adenomatoid tümör ile karşılaşmıştır. Adenomatoid tümörler nodüler olabildiği gibi belirsiz sınırlı da olabilir. Tübüler kistik ve daha nadiren papiller yapılardan ve yarık benzeri boşluklardan oluşur, döşeyici epiteli yassılaştırmış ya da kübik özelliktedir ve mitoz görülmez. Hücreler immünohistokimyasal olarak kalretinin ile boyanır.

İnsidental saptanan nadir görülen senkron iki tümörlü olguyu sunmak istedik. Adenomatoid tümörün uterusunda nodüler lezyonlarda ayırıcı tanıda akılda tutulması gerekir

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Anahtar Kelimeler : Uterus, Adenomatoid tümör