

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Poster Sunum

Hepatobilier ve Pankreas Patoloji

PS560

PANKREAS ADENOKARSİNOMUNDA NEOADJUVAN KEMOTERAPİ SONRASI HİSTOPATOLOJİK TÜMÖR CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Deniz Tunçel¹, Banu Yılmaz Özgüven¹, Muharrem Battal², Şermin Güven³, Ramazan Uçak¹, Ahu Gülçin Sarı¹, Fevziye Kabukçuoğlu¹

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Suam, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Suam, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

³Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Suam, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı

Amaç: Pankreas adenokarsinomu, fatal bir hastalık olup beklenen 5 yıllık yaşam şansı %5'in altındadır. Neoadjuvan tedavi yöntemleri pankreatik adenokarsinomlarında pankreatikoduodenektomiden önce uygulanabilecek etkili stratejilerden biri olmaya adaydır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2012'den itibaren tanısı konmuş 157 pankreatik adenokarsinom olgusundan toplam 6 hastanın 4'ünde ilk tümör gelişim sürecinde operasyon öncesi, 2'sinde nüks gelişmiş hastaya neoadjuvan kemoterapi (NAK) uygulandı. Kemoterapi sonrası gerçekleştirilen operasyonlara ait spesimenler histopatolojik tümör cevabı açısından değerlendirildi.

Bulgular: 6 olgudan 5'i erkek biri kadın olup yaş ortalaması 59.1 idi. NAK uygulanan bu olgulardan 2'sine Whipple operasyonu, 1'ine total pankreatektomi, 2'sine subtotal pankreatektomi, 1'ine distal pankreatektomi uygulandı. Histopatolojik incelemede tüm olgularda pankreatik adenokarsinom saptandı. Ortalama tümör boyutu 3.1 cm olup 3 olgu pT3, 1 olgu pT2, 2 olgu pT1 olarak görüldü. 3 olguda lenf nodu metastazı gözlemlendi. Tümör regresyon derecelendirmesi College of American Pathologists (CAP) and Evans derecelendirme sistemine göre yapıldı. Tüm olgularda CAP Derece III, Evans Derece I (tedaviye kötü yanıt) olarak değerlendirildi.

Sonuç

Neoadjuvan kemoterapi, diğer tedavi yöntemlerini destekleyici olarak kullanılmakta olup rezektabiliteyi artırması nedeniyle değerlendirilebilir bir yöntemdir. Ayrıca NAK ile operasyon şansı yakalayan lokal ileri olguların opere edilebilen olguların sağkalımına ulaştığına dair çalışmalar bildirilmektedir. Ancak geniş serilerde yapılacak çalışmalarını takip ederek yol almak bu süreçte önemli olacaktır.

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Anahtar Kelimeler : Neoadjuvan, kemoterapi, pankreas, adenokarsinom